

レジメン名	DAV-Feron療法	DTIC(1,2,3,4,5)+ACNU(1)+VCR(1)【q28d】
がん種又は疾患名	悪性黒色腫	

承認されたレジメン			
1日目			
<内服>	イメンドカプセルセット	1枚	
	初日 実施の1時間以上前に内服		
	2～3日目 朝食後内服	経口	
<本体1>	ソリューゲンF	500mL	5時間
<側管点滴1>	デキサメタゾン	9.9mg	
	アロキシ	1A	
	生食	100mL	30分
<側管点滴2>	ダカルバジン	80～140 mg/m ²	
	蒸留水(溶解用)	10mL(ダカルバジン1Vに対し)	
	生食	100mL	60分
<側管静注1>	ニドラン	50～80 mg/m ²	
	蒸留水	10mL(ニドラン50mg1Vに対し)	
	(シリンジに入れる)		5分
<側管静注2>	オンコピン	0.5～0.8 mg/m ²	
	生食	10mL(オンコピン1Vに対し)	
	(シリンジに入れる)		5分
<本体2>	ヘパリンNaロック注	1本	
<皮下注>	フェロン注300万単位	1V	
2～5日目			
<本体1>	ソリューゲンF	500mL	5時間
<側管点滴1>	デキサメタゾン	9.9mg	
	生食	100mL	30分
<側管点滴2>	ダカルバジン	80～140 mg/m ²	
	蒸留水(溶解用)	10mL(ダカルバジン1Vに対し)	
	生食	100mL	60分
<本体2>	ヘパリンNaロック注	1本	
<皮下注>	フェロン注300万単位	1V	