

レジメン名	GC療法(泌尿器)	GEM(1,8,15)+CDDP(2)【q28d】
がん種又は疾患名	尿路上皮がん、膀胱がん	

承認されたレジメン			
Day 1			
<本体1>	デカドロン 生食	6.6mg 100mL	30分
<本体2>	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分
<本体3>	YDソリタT3	500mL	100分
<本体4>	フィジオ140輸液	500mL	100分
<本体5>	生食	50mL	15分
Day 2			
<内服>	イメンドカプセルセット 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服	1枚	
<本体1>	YDソリタT3	500mL	100分
<本体2>	デカドロン アロキシ 生食	9.9mg 1V 100mL	30分
<本体3>	生食	500mL	100分
<本体4>	シスプラチン 生食	70mg/m ² 500mL	120分
<本体5>	マンニトール	300mL	45分
<本体6>	フィジオ140輸液	500mL	100分
<本体7>	YDソリタT3	500mL	100分
<本体8>	生食	50mL	15分
Day 3,4			
<本体1>	デカドロン 生食	6.6mg 100mL	30分
<本体2>	フィジオ140輸液	500mL	100分
<本体3>	YDソリタT3	500mL	100分
<本体4>	生食	50mL	15分
Day 8, 15			
<本体1>	デカドロン 生食	6.6mg 100mL	30分
<本体2>	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分
<本体3>	生食	50mL	15分