

レジメン名	C-mab+FP療法	C-mab(1,8,15)+CDDP(1)+5-FU(1, 2, 3, 4)【q21d】
がん種又は疾患名	頭頸部癌	

承認されたレジメン		
day 1		
<内服>	イメンドカプセルセット	1枚 初日 CDDPの1時間以上前に内服 2～3日目 朝食後内服
<本体1>	生食 2000mL	7時間
<側管1>	アロキシ 1A デキサメタゾン 9.9mg ポララミン注5mg 1A 生食 100mL	30分
<側管2>	アービタックス 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) 生食 250mL	初回2時間 2回目以降1時間
<側管3>	生食 100mL	アービタックス投与と同じ速度で
<側管4>	マンニトール 300mL	45分
<側管5>	シスプラチン 80mg/m ² 生食 500mL	2時間
<側管6持続>	5FU 800mg/m ² 生食 1000mL	24時間
day 2, 3, 4		
<側管持続>	5FU 800mg/m ² 生食 1000mL	24時間
<本体1>	デキサメタゾン 6.6mg プリンペラン 20mg ソルアセトF 500mL	2時間
<本体2>	ソルアセトF 500mL	2時間
day 8, 15		
<本体1>	デキサメタゾン 3.3mg ポララミン注5mg 1A 生食 100mL	30分
<本体2>	アービタックス 250mg/m ² (2回目以降) 生食 250mL	1時間
<本体3>	生食 50mL	アービタックス投与と同じ速度で