

レジメン名	ヘムブロシマブ+FP療法	ヘムブロシマブ(1)+CDDP(1)+5FU(1,2,3,4,5)【q21d】
がん種又は疾患名	食道癌	

承認されたレジメン			
day 1			
<内服>	イメンドカプセルセット	1枚	
		初日	実施の1時間以上前に内服
		2～3日目	朝食後内服
<本体1>	生食	50mL	6分
	*0.2又は0.22ミクロンのインラインフィルターを使用すること		
<本体2>	キイトルーダ	200mg	
	生食	100mL	30分
<本体3>	生食	50mL	6分
<本体4>	YDソリタT3	500mL ×2	4時間
<側管持続>	5FU	800mg/m ²	*YDソリタT3と同時に開始
	生食	1000mL	
	適宜生食を抜き全量 1000mLにする		24時間
<本体5>	アロキシ	1A	
	生食	100mL	30分
<本体6>	シスプラチン	80mg/m ²	
	生食	500mL	
	適宜生食を抜き全量 500mLにする		2時間
<本体7>	デキサメタゾン	9.9mg	
	プリンペラン	20mg	
	ソルアセトF	500mL	2時間
<本体8>	生食	1000mL	3時間
day 2, 3, 4, 5			
<側管持続>	5FU	800mg/m ²	
	生食	1000mL	
	適宜生食を抜き全量 1000mLにする		24時間
<本体1>	デキサメタゾン	6.6mg	
	プリンペラン	20mg	
	ソルアセトF	500mL	2時間
<本体2>	ソルアセトF	500mL	2時間