

|          |                          |                                              |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------|
| レジメン名    | パ*ム7*ロリス*マ7*+CBDCA+PAC療法 | パ*ム7*ロリス*マ7* (1)+CBDCA(1)+PAC(1,8,15) 【q21d】 |
| がん種又は疾患名 | 乳癌                       |                                              |

| 承認されたレジメン                                                                                              | 承認されたカスタマイズの範囲                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| d a y 1                                                                                                |                                       |
| <内服> イメンドカフ セルセット 1枚<br>初日 実施の1時間以上前に内服<br>2~3日目 朝食後内服                                                 |                                       |
| <本体1> パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋<br>ポララミン注5mg 1A<br>ファモチジン注20mg 1A<br>デキサメタゾン 6.6mg 30分<br>※フィルター付き点滴ラインを使用 | ステロイドは省略してはいけない<br>5-HT3拮抗薬は省略してはいけない |
| <本体2> 生食 100mL 30分<br>キイトルーダ 200mg                                                                     | 希釈後の最終濃度は1-10mg/mLとする<br>200mg/body   |
| <本体3> 生食 50mL 6分                                                                                       | フラッシングのために必須                          |
| <本体4> 5%ブドウ糖 250mL<br>パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> 60分                                                  |                                       |
| <本体5> 5%ブドウ糖 250mL<br>カルボプラチン AUC 5 60分                                                                |                                       |
| <本体6> 生食 50mL 6分                                                                                       | フラッシングのために必須                          |
| d a y 8,15                                                                                             |                                       |
| <本体1> 生食 30mL 6分<br>ポララミン注5mg 1A<br>ファモチジン注20mg 1A<br>デキサメタゾン 6.6mg<br>※フィルター付き点滴ラインを使用                | ステロイドは省略してはいけない                       |
| <本体2> 生食 100mL 30分                                                                                     |                                       |
| <本体3> 5%ブドウ糖 250mL<br>パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> 60分                                                  |                                       |
| <本体4> 生食 50mL 6分                                                                                       | フラッシングのために必須                          |