

| | | |
|----------|--------------|-----------------------|
| レジメン名 | フェスゴ+DOC療法 | フェスゴ(1)+DOC(1) 【q21d】 |
| がん種又は疾患名 | 手術不能または再発乳癌* | |

* HER2陽性の患者に限る

| 承認されたレジメン | 承認されたカスタマイズの範囲 |
|---|--|
| <p><皮下注> (初回)フェスゴ配合皮下注 IN 15mL (2回目以降)フェスゴ配合皮下注 MA 10mL</p> <p>初回8分以上 2回目以降5分以上</p> | <p>直針使用し、手押しで大腿部へ皮下注。 2回目以降は同一箇所への注射は避け、 左右の大腿部に交互に投与。 投与終了後、30分の経過観察を行う。2回目以降は、 忍容性が良好であれば観察時間15分まで短縮可。</p> |
| <p><本体1> 生食 30mL 6分 デキサメタゾン 6.6mg ファモチジン注20mg 1A パララミン注5mg 1A</p> | <p>フェスゴの経過観察終了後に投与開始。</p> |
| <p><本体2> ドセタキセル 75mg/m² 5%ブドウ糖液 250mL 60分</p> | <p>患者の状態に応じて適宜増減可能だが、75mg/m²までとする 生理食塩液にしてもよい *ドセタキセルは6サイクル目まで投与し、7サイクルからは 医師の判断で継続する</p> |
| <p><本体3> 生食 50mL 6分</p> | <p>患者の状態に応じて他の輸液にかえてもよい。 ルートフラッシュ</p> |