

レジメン名	Bmab+PAC療法	Bmab(1,15)+PAC(1,8,15)【q28d】
がん種又は疾患名	乳がん	

承認されたレジメン				
day1				
<本体1>	生食	80mL	<u>12分</u>	
	デキサメタゾン	6.6mg		
	ポララミン注	1A		
	ファモチジン20mg	1A		
	*フィルター付き点滴ラインを使用			
<本体2>	アバスチン	10mg/kg	初回	90分
	生食	100mL	2回目	60分
			3回目以降	30分
<本体3>	生食	50mL	30分	
<本体4>	5%ブドウ糖	250mL		
	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	60分	
<本体5>	生食	50mL	6分	
day8				
<本体1>	生食	80mL	<u>12分</u>	
	デキサメタゾン	6.6mg		
	ファモチジン(20mg/2mL)	1A		
	ポララミン注	1A		
	*フィルター付き点滴ラインを使用			
<本体2>	生食	100mL	30分	
<本体3>	5%ブドウ糖	250mL		
	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	60分	
<本体4>	生食	50mL	6分	
day15				
<本体1>	生食	100mL		
	デキサメタゾン	6.6mg		
	ポララミン注	1A		
	ファモチジン20mg	1A		
	*フィルター付き点滴ラインを使用			<u>12分</u>
<本体2>	アバスチン	10mg/kg	初回	90分
	生食	100mL	2回目	60分
			3回目以降	30分
<本体3>	生食	50mL	30分	
<本体4>	5%ブドウ糖	250mL		
	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	60分	
<本体5>	生食	50mL	6分	