

レジメン名	FP療法	CDDP(1)+5FU(1, 2, 3, 4, 5)【q28d】
がん種又は疾患名	食道癌	

承認されたレジメン			
day 1			
<内服>	イメンドカプセルセット	1枚	
		初日 実施の1時間以上前に内服	
		2~3日目 朝食後内服	
<本体1>	YDソリタT3	500mL ×2	4時間
<側管持続>	5FU	800mg/m ²	
	生食	1000mL	
	適宜生食を抜き全量	1000mL程度にする	24時間
<本体2>	アロキシ	1A	
	生食	100mL	30分
<本体3>	シスプラチン	80mg/m ²	
	生食	500mL	
	適宜生食を抜き全量	600mL 程度にする	2時間
<本体4>	デキサメタゾン	13.2mg	
	プリンペラン	20mg	
	ソルアセトF	500mL	2時間
<本体5>	生食	1000mL	3時間
day 2, 3, 4, 5			
<側管持続>	5FU	800mg/m ²	
	生食	1000mL	
	適宜生食を抜き全量	1000mL程度にする	24時間
<本体1>	デキサメタゾン	13.2mg	
	プリンペラン	20mg	
	ソルアセトF	500mL	2時間
<本体2>	ソルアセトF	500mL	2時間